

Herbicida

|       |   |
|-------|---|
| GRUPO | E |
|-------|---|

**FLEX®**

Concentrado soluble (SL)

**Composición:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>fomesafen:</b> 5-(2-cloro- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-p-toliloxi)-N-metilsulfonil-2-nitrobenzamida..... | 25 g                |
| inertes y coadyuvantes c.s.p.....   | 100 cm <sup>3</sup> |

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Inscrito ante el SENASA con el N° 30.345.

Lote N°:

Vencimiento:

Origen: Brasil / Reino Unido

Contenido Neto: 5 Litros

No inflamable.

Agítese antes de usar.

Los nombres de producto que contengan ® o ™ y el marco CP FRAME son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta.

**SYNGENTA AGRO S.A.**

Av. Del Libertador 1855 (B1638BGE) Vicente López.

Buenos Aires, Argentina

Tel: (011) 4837-6500 / Fax: (011) 4837-6501

**Centro de Agrosoluciones Syngenta**

0 800 444 4804

agro.soluciones@syngenta.com

www.syngenta.com.ar

## RECOMENDACIONES DE USO

### GENERALIDADES

**FLEX**® es un herbicida postemergente para el control de malezas de hoja ancha en los cultivos de soja, maní y poroto. **FLEX**® actúa por contacto, por lo que se debe realizar una buena aplicación, para lograr una buena cobertura de las malezas y asegurar los mejores resultados.

**FLEX**® también puede usarse en preemergencia del cultivo de soja, aplicado en combinación con acetoclor 90% p/v EC, para el control de malezas de hoja ancha. En este caso actúa en forma sistémica, siendo absorbido por las raíces de las plantas.

### INSTRUCCIONES PARA EL USO

#### PREPARACION

**FLEX**® es un concentrado soluble en agua. Para una correcta preparación respetar las siguientes instrucciones:

- Agregar agua al tanque de la pulverizadora, hasta la mitad de su volumen. Poner a funcionar el sistema de agitación.
- Añadir la cantidad necesaria de **FLEX**®, de acuerdo a la calibración realizada, directamente en el tanque y sin disolución previa. Verificar que el producto se disuelva completamente.
- Completar el tanque con agua hasta el volumen final.
- Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento, para mantener la suspensión. Usar **FLEX**® dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto. Reagitar el caldo antes de reanudar la aplicación. Utilizar siempre agua limpia.

## EQUIPOS, VOLUMENES Y TECNICAS DE APLICACION

**FLEX** ® debe ser aplicado en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 30 – 40 gotas/cm<sup>2</sup> sobre las hojas de las malezas.

**FLEX** ® puede aplicarse con equipos pulverizadores terrestres de barra o botalón, calibrados para funcionar a 2-2.8 bar (30-40 lb/pg<sup>2</sup>) de presión en aplicaciones de preemergencia y de 4-7 bar (60-100 lb/pg<sup>2</sup>) en aplicaciones de postemergencia. Emplear picos con pastillas de abanico plano de 110° (Twinjet N° 80015, 8002, 8003 ó sus equivalentes). Es conveniente distanciar los picos a 50 cm (o menos) entre sí, para poder trabajar a menor altura sobre las malezas. Lavar previamente el equipo pulverizador para eliminar restos de otros productos fitosanitarios (especialmente herbicidas hormonales como 2,4-D, etc) que podrían causar daños al cultivo. En aplicaciones de postemergencia utilizar volúmenes de 150 a 200 litros de agua limpia por hectárea, con agregado de coadyuvante no iónico. En aplicaciones de preemergencia usar un volumen mínimo de 100 litros de agua por hectárea.

Para aplicaciones en banda emplear pastillas de abanico uniforme (Tipo E). Ajustar las dosis de **FLEX** ® y el volumen a usar según el ancho de la banda a tratar.

**FLEX** ® también puede aplicarse con equipos aéreos de pulverización, para estos casos usar un volumen mínimo de 20 litros de agua por hectárea. Consultar al servicio técnico de Syngenta Agro S. A., cuando la aplicación aérea sea la técnica elegida para el uso de **FLEX** ®.

Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición de franjas durante la pulverización. Evitar la deriva hacia cultivos linderos. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvia. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

## ADITIVOS

Para lograr la máxima eficacia de **FLEX** ®, se recomienda aplicarlo acompañado con humectante no iónico en una concentración de 200 cm<sup>3</sup> cada 100 litros de caldo (0.2 % v/v).

## LAVADO DE EQUIPOS

Es importante limpiar bien el equipo de aplicación, una vez terminada la misma. Respetar las siguientes indicaciones: Vaciar completamente el equipo. Enjuagar el tanque, mangueras y picos con agua limpia. De ser posible, utilizar una lavadora a presión con agua para limpiar el interior del tanque. Poner en marcha el sistema de agitación y hacer recircular el agua por al menos 15 minutos. Todos los remanentes visibles deben ser eliminados del equipo de aplicación. Retirar los picos y pastillas y lavarlos separadamente, después de realizar los pasos precedentes. Eliminar el líquido utilizado en sitios donde no exista riesgo de contaminación de aguas superficiales ni subterráneas.

## RECOMENDACIONES DE USO

**FLEX**® puede aplicarse mediante los siguientes tratamientos:

### Tratamientos de postemergencia:

Los mejores resultados se obtendrán realizando la aplicación cuando se ha completado la emergencia de la mayoría de las malezas y éstas tengan entre 2 a 4 hojas verdaderas. Es importante tener en cuenta que **FLEX**® debe aplicarse cuando las malezas están creciendo activamente, es decir, cuando haya una adecuada humedad en el suelo y no existan condiciones estresantes para las mismas (muy altas temperaturas, etc).

Dado que **FLEX**® actúa por contacto, si se hubiese pasado una rastra rotativa o un escardillo antes de la aplicación, deberán transcurrir algunos días para que emerjan las malezas que fueron cubiertas con tierra. Después de la aplicación dejar transcurrir 2 días antes de escardillar.

Estudios detallados han permitido ajustar las dosis según las especies de malezas y momento de aplicación, teniendo en cuenta las distintas situaciones de enmalezamiento que se presenten. En consecuencia, antes de aplicar **FLEX**® en postemergencia, se recomienda inspeccionar cuidadosamente el cultivo a tratar, para emplear la dosis ajustada con la mayor precisión posible, según las especies presentes y el estado vegetativo de las mismas.

| CULTIVO | MALEZAS   | DOSIS SEGÚN ESTADO DE DESARROLLO DE MALEZAS   | MOMENTO DE APLICACIÓN   |
|---------|---|---|---|
| MANÍ    | <b>Bejuco o Campanilla</b> ( <i>Ipomoea spp.</i> )<br><b>Chamico</b> ( <i>Datura ferox</i> )<br><b>Malva Cimarrona</b> ( <i>Anoda cristata</i> )<br><b>Torito</b> ( <i>Acanthospermum hispidum</i> )<br><b>Yuyo colorado o Ataco</b> ( <i>Amaranthus spp.</i> ) | 2-4 hojas:<br><b>0,30-0,40 litros/ha</b><br>+ 0,25-0,30 litros/ha<br>de 2,4 DB 100% p/v   | Aplicar en postemergencia del cultivo, en función del tamaño de las malezas presentes. Utilizar con humectante no iónico en una concentración de 200 cm <sup>3</sup> /100 litros de agua (0.2 % v/v). |
|         | <b>Quinoa o Yuyo blanco</b> ( <i>Chenopodium album</i> )  | 2-8 hojas:<br><b>0,30-0,40 litros/ha</b><br>+ 0,25-0,30 litros/ha<br>de 2,4 DB 100% p/v   |   |
|         | <b>Verdolaga</b> ( <i>Portulaca oleracea</i> )  | Hasta 10 cm:<br><b>0,30-0,40 litros/ha</b><br>+ 0,25-0,30 litros/ha<br>de 2,4 DB 100% p/v |   |

| CULTIVO                                 | MALEZAS   | DOSIS SEGÚN ESTADO DE DESARROLLO DE MALEZAS   | MOMENTO DE APLICACIÓN   |
|---|---|---|---|
| POROTO<br>SOJA                          | Abrojo grande ( <i>Xanthium cavanillesii</i> )                          | Hasta 4 hojas:<br><b>1,35 litros/ha</b>   | Aplicar en postemergencia del cultivo, en función del tamaño de las malezas presentes. Utilizar con humectante no iónico en una concentración de 200 cm <sup>3</sup> /100 litros de agua (0.2 % v/v). |
|   | Bejuco o Campanilla ( <i>Ipomoea spp.</i> )                             | Hasta 5 cm (4 hojas):<br><b>1,35 litros/ha</b>  |   |
|   | Cepa caballo ( <i>Xanthium spinosum</i> )                               | Hasta 4 hojas:<br><b>1,00 litro/ha</b>  |   |
|   | Chamico ( <i>Datura ferox</i> )   | Hasta 5 cm: <b>0,70 litros/ha</b><br>Hasta 10 cm: <b>0,90 litros/ha</b><br>Hasta 20 cm: <b>1,15 litros/ha</b> |   |
|   | Chinchilla ( <i>Tagetes minuta</i> )                                    | Hasta 10 cm:<br><b>1,00 litro/ha</b>  |   |
|   | Cuerno del diablo ( <i>Ibicella lutea</i> )                             | Hasta 4 hojas:<br><b>1,00 litro/ha</b>  |   |
|   | Farolito ( <i>Nicandra physaloides</i> )                                | De 4 a 6 hojas:<br><b>0,80 litros/ha</b>  |   |
|   | Girasolillo ( <i>Verbesina encelioides</i> )                            | Hasta 5 cm: <b>0,80 litros/ha</b><br>Hasta 15 cm: <b>1,00 litros/ha</b>                                       |   |
|   | Lagunilla ( <i>Alternanthera philoxeroides</i> )                        | Hasta 5 cm:<br><b>1,00 litro/ha</b>   |   |
|   | Lecherón ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )                              | 2-4 hojas:<br><b>1,50 litros/ha</b>   |   |
|   | Malva Cimarrona ( <i>Anoda cristata</i> )                               | Hasta 5 cm (4 hojas):<br><b>1,35 litros/ha</b>  |   |
|   | Nabo ( <i>Brassica campestris</i> )                                     | Hasta 4-5 hojas: <b>0,70 litros/ha</b><br>Más de 5 hojas: <b>0,90 litros/ha</b>                               |   |
|   | Pasto cubano ( <i>Tithonia tubaeformis</i> )                            | Hasta 10 cm:<br><b>0,80 litros/ha</b>   |   |
|   | Quinoa o Yuyo blanco ( <i>Chenopodium album</i> )                       | Hasta 5 cm (4 hojas):<br><b>1,00 litro/ha</b>   |   |
|   | Saetilla ( <i>Bidens pilosa</i> )                                       | Hasta 10 cm:<br><b>1,00 litro/ha</b>  |   |
|   | Yuyo colorado o Ataco ( <i>Amaranthus quitensis</i> )                   | Hasta 5 cm: <b>0,90-1,35 litros/ha</b>  |   |
| Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) | Hasta 5 cm: <b>0,70 litros/ha</b><br>Más de 5 cm: <b>0,90 litros/ha</b> |   |   |

**Tratamientos de preemergencia:**

**FLEX**® también puede usarse en preemergencia del cultivo de soja, aplicado en combinación con acetoclor 90% p/v EC, para el control de malezas de hoja ancha. En este caso actúa en forma sistémica, siendo absorbido por las raíces de las plantas. Es importante considerar que **FLEX**® aumenta su actividad en condiciones de suelo húmedo. Debe tenerse en cuenta el ajuste de dosis según el tipo de suelo y contenido de materia orgánica.

| CULTIVO | MALEZAS   | DOSIS SEGÚN TIPO DE SUELO   | MOMENTO DE APLICACIÓN   |
|---------|---|---|---|
| SOJA    | <b>Alkekenje</b> ( <i>Physalis angulata</i> ; <i>P. pubescens</i> )<br><b>Bejuco o Campanilla (*)</b> ( <i>Ipomoea nil</i> )<br><b>Bejuco o Campanilla</b> ( <i>Ipomoea purpurea</i> )<br><b>Capín arroz</b> ( <i>Echinochloa crus galli</i> )<br><b>Cola de zorro</b> ( <i>Setaria spp.</i> )<br><b>Chamico (*)</b> ( <i>Datura ferox</i> )<br><b>Chinchilla</b> ( <i>Tagetes minuta</i> )<br><b>Escoba dura o Afata</b> ( <i>Sida rhombifolia</i> )<br><b>Escoba dura o Afata hembra</b> ( <i>Sida spinosa</i> )<br><b>Malva Cimarrona</b> ( <i>Anoda cristata</i> )<br><b>Pasto de cuaresma</b> ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )<br><b>Quinoa o Yuyo blanco</b> ( <i>Chenopodium album</i> )<br><b>Saetilla</b> ( <i>Bidens pilosa</i> )<br><b>Sorgo de Alepo de semilla</b> ( <i>Sorghum halepense</i> )<br><b>Yerba de pollo</b> ( <i>Richardia brasiliensis</i> )<br><b>Yuyo colorado o Ataco (**)</b> ( <i>Amaranthus spp.</i> )<br><b>Yuyo sapo o Clavel amarillo (*)</b> ( <i>Wedelia glauca</i> ) | <b>Suelos Livianos</b><br>(con bajo contenido de Materia Orgánica):<br><b>0,75 litros/ha</b><br>+ 0,75 litros/ha de acetoclor 90 % p/v EC | Aplicar en preemergencia del cultivo, según el tipo de suelo. Aplicar en mezcla con acetoclor 90 % p/v EC |
|         | <b>Suelos Medios o Pesados</b><br>(con alto contenido de Materia Orgánica):<br><b>1 litro/ha</b><br>+ 1 litro/ha de acetoclor 90 % p/v EC   |   |   |

(\*) Control parcial en altas infestaciones.

(\*\*) Incluye Ataco (*Amaranthus spp.*) resistente a otros grupos químicos.

**RESTRICCIONES DE USO**

**Periodo de carencia:** Dejar transcurrir 60 días entre la aplicación de **FLEX**® y la cosecha del cultivo. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Si por alguna razón se malogra el cultivo, sembrar únicamente soja.

**Rotaciones:** En caso de haber realizado una aplicación preemergente con un herbicida que contenga fomesafen (**FLEX**® o **EDDUS**®), y además una aplicación en postemergencia (**FLEXSTAR**® GT o **EDDUS**®), se puede sembrar trigo, maíz o sorgo granífero al año siguiente.

Con inviernos muy secos y fríos, y en suelos livianos y/o con bajo contenido de materia orgánica, pueden presentarse síntomas iniciales de fitotoxicidad en los cultivos mencionados.

No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

## PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIAS

**FLEX**® pertenece al grupo **E** de los herbicidas.

Para prevenir la selección de plantas naturalmente resistentes a un herbicida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de herbicidas en la estrategia de manejo de malezas en el lote, mediante la combinación con otros herbicidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar un biotipo resistente a un herbicida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlado ese biotipo a lo largo del ciclo del cultivo.

## COMPATIBILIDAD

Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

En aplicaciones de postemergencia puede ser de utilidad la aplicación de **FLEX**® con graminicidas. También puede emplearse la mezcla de **FLEX**® con 2,4 DB (únicamente en soja y maní) para mejorar el control de algunas malezas. En ambos casos y antes de aplicar tales mezclas consultar al servicio técnico de Syngenta Agro S. A.

En aplicaciones de preemergencia, en el cultivo de soja, utilizar **FLEX**® en mezcla con acetoclor 90 % p/v (EC).

## FITOTOXICIDAD

**FLEX**® es selectivo para soja, maní y poroto en todo el desarrollo del cultivo, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta. Dosis elevadas (por ejemplo, por superposición de pasadas) o condiciones de muy alta humedad y excesiva temperatura pueden causar ligeras quemaduras punteadas en las hojas, pero el cultivo se recupera rápidamente sin que sea afectado el rendimiento.

## AVISO DE CONSULTA TECNICA

### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

El fabricante garantiza la calidad del producto solamente cuando el usuario lo adquiere con el embalaje original cerrado. Las recomendaciones tienen la única finalidad de aconsejar al usuario en base exclusivamente al último estado de los conocimientos del fabricante sobre la utilización del producto. La acción del producto puede resultar influenciada por un gran número de factores tales como condiciones climáticas y del suelo, especies de plantas, resistencias, técnicas de pulverización, tipos de aplicación, entre otros. El riesgo correspondiente lo asume el usuario. El fabricante no será responsable por daños que pudieren derivar del almacenamiento o aplicación inadecuado, o que no se ajusten a las recomendaciones de uso.

## PRECAUCIONES

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
- INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.
- EN CASO DE INTOXICACION, LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.
- EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.
- PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

## MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES

**Este producto es nocivo si es ingerido o absorbido por la piel. Evitar todo contacto con la piel, ojos y ropa.**

**Para su seguridad durante la preparación y aplicación:** Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. No comer, beber, ni fumar durante el manipuleo del producto. Evitar el contacto con el pulverizado. No destapar picos ni boquillas con la boca.

**Para su seguridad después del tratamiento:** Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante de **FLEX**® en su envase original, bien cerrado.

## RIESGOS AMBIENTALES

**FLEX**® es virtualmente no tóxico para abejas. Evitar la aplicación en las horas de mayor actividad de las mismas. Si es posible, retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación, por un tiempo de 30 días, o bien entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas húmedas durante la aplicación, retirando las bolsas pasada la misma. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

**FLEX**® es prácticamente no tóxico para aves y para peces. No aplicar, drenar o enjuagar el equipo utilizado cerca de fuentes de agua, forrajes y plantas deseables, ni en áreas donde puedan extender sus raíces, ya que pueden resultar dañadas. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

## TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN

Preparar la cantidad de producto que se va a utilizar, evitando remanentes. El caldo remanente no se podrá reutilizar en otra oportunidad. El mismo debe ser eliminado en forma segura, sin contaminar aguas cercanas. El producto remanente en el tanque de la pulverizadora puede diluirse agregando agua limpia en una cantidad igual a cinco veces el volumen de caldo existente. Se puede volver a aplicar este nuevo preparado sobre barbechos, caminos y áreas no cultivadas ni pastoreadas alejadas de donde haya tránsito frecuente de personas y animales domésticos, evitando riesgos para cultivos siguientes.



## TRATAMIENTO Y METODO DE DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS

Los envases vacíos no pueden volverse a utilizar. Respetar las siguientes instrucciones para el Triple Lavado Norma IRAM 12.069: Agregar agua hasta cubrir un cuarto de la capacidad del envase, cerrar y agitar durante 30 segundos. Luego verter el agua del envase en el recipiente dosificador (considerar este volumen de agua dentro del volumen recomendado de la mezcla). Realizar este procedimiento **3 veces**. Finalmente, inutilizar el envase perforándolo e intentando no dañar la etiqueta al efectuar esta operación. Los envases perforados deben colocarse en contenedores para ser enviados a una planta especializada para su destrucción final. No enterrar ni quemar a cielo abierto los envases y demás desechos.

## ALMACENAMIENTO

Proteger el producto del sol y de la humedad. Almacenar en su envase original, bien cerrado, claramente identificado y lejos de alimentos humanos y forrajes. Mantener fuera del alcance de niños, personas inexpertas y animales domésticos. Evitar temperaturas bajo 0°C y sobre 35° C.

## DERRAMES

Cubrir los derrames con material absorbente (tierra o arena). Barrer el producto absorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

## PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de intoxicación llamar al médico. Trasladar al paciente a un lugar ventilado.**

**En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Enjuagar la boca con abundante agua limpia. No administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Dar atención médica de inmediato.

**En caso de contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona expuesta, y la ropa que hubiese tomado contacto con el producto, con abundante agua y jabón. Dar atención médica si la piel está irritada.

**En caso de contacto con los ojos:** Lavar los ojos separando los párpados con los dedos con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. No intentar neutralizar la contaminación con productos químicos. Dar atención médica inmediata.

**En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire libre. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal.

## ADVERTENCIAS PARA EL MEDICO

### CLASE TOXICOLÓGICA III - PRODUCTO LIGERAMENTE PELIGROSO

Leve irritante dermal (CUIDADO). Categoría IV: Evitar el contacto con la piel y la ropa.

Moderado irritante ocular (CUIDADO). Categoría III: Causa irritación moderada a los ojos.

**No sensibilizante dermal.**

No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Tratamiento sugerido: Remover el tóxico mediante lavado de piel o lavado de estómago (cuidando de no aspirar el contenido gástrico), forzar diuresis, administrar protectores hepáticos y controlar el aparato cardiovascular. Dar tratamiento sintomático y de sostén.

## CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

### CENTRO TOXICOLÓGICO PERMANENTE (todo el año, 24 horas por día):

- T.A.S. - CASAFE - Tel.: (0341) 4480077 / 4242727 ó 0800-888-TOXI (8694) - Tucumán 1544. (2000) Rosario, Santa Fe.

### CAPITAL FEDERAL:

- Unidad toxicológica del Hospital Municipal de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.
- Hospital de Clínicas. Universidad de Buenos Aires. Tel.: (011) 5950-8804 / 06 y (011) 5950-8000

### BUENOS AIRES:

- Centro Nacional de Intoxicaciones Policlínico Posadas, Haedo. Tel.: (011) 4658-7777 y (011) 4654-6648

### CORDOBA:

- Hospital de Niños. Tel: (0351) 458-6400
- Hospital de Urgencias. Tel: (0351) 427-6200

Banda de categoría toxicológica: Azul PMS 293 C

